

TIGANIL® 100



TIAMULINA 10% - POLVO ORAL

Código

400780

Composición

Cada 1000 g de producto contienen:

Tiamulina fumarato hidrogenado

(Eqv. 100g de Tiamulina base)

125 g

Excipientes c.s.p.

1000 g

Especie de destino

Aves: ponedoras (crianza y recría), pollos *broiler*, pavos, cerdos.

Indicaciones

TIGANIL® 100 actúa en el tratamiento de la Disentería y Neumonía Enzootica porcina y Enfermedad Respiratoria Crónica de las aves, causadas por gérmenes sensibles a la Tiamulina.

Vía de administración y dosis

Para incorporar en el alimento.

Cerdo: 10mg de Tiamulina base/kg PV/día, equivalente a 200ppm de Tiamulina base (2kg de **TIGANIL® 100**/Ton. Alimento), considerando consumo de 5% PV, durante 10 días.

Aves: 32mg de Tiamulina base/kg PV/día, equivalentes a 320ppm de Tiamulina base (3,2g de **TIGANIL® 100**/Ton. Alimento), considerando consumo de 10% PV, durante 5 días en pollos *broiler* y ponedoras en crianza o recría y durante 3 días en pavos.

Precauciones para la planta de alimentos

1. Verificar que el mezclador donde se incorpora **TIGANIL® 100** esté comprobadamente libre de contaminantes (residuos de medicamentos u otros); la planta de alimentos debe tener procedimientos de limpieza validados, o bien, línea única de mezclado por medicamento.
2. Es recomendable efectuar un mezclado previo de **TIGANIL® 100** en a lo menos 5kg de alimento antes de incorporar en una tonelada de alimento.
3. En el caso en que se utilice tecnología que incorpora calor, deberá verificar que el proceso no altere el medicamento en el producto final.
4. Verificar la correcta homogenización y el contenido activo de **TIGANIL® 100** en el producto final (medicamento con base alimento) previamente a su comercialización.

5. Para mantener la trazabilidad, se recomienda rotular el producto final con la siguiente información: medicamento, Fecha de elaboración, dosis, nombre del veterinario tratante, nombre del centro productivo, serie, pauta horaria, duración del tratamiento y las frases: **TIGANIL® 100** no cuenta con estudios de estabilidad luego de incorporado en el alimento, administrar inmediatamente.

Precauciones para el operador

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el contacto directo con piel y ojos, usar guantes, gafas, mascarilla y ropa de seguridad.

Advertencia

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No utilizar en cerdos con pesos sobre los 110kg, no utilizar en hembras en gestación, ni en verracos, así como que se debe utilizar el producto con la evaluación riesgo beneficio realizado por el médico veterinario. No mezclar con alimentos que contengan como principios activos Monensina, Salinomicina o Narasina.

Período de resguardo

Carne: 7 días

No administrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen a consumo humano

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C) en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original.

Presentaciones

Bolsas 10 y 25kg. Caja 10kg. Baldes 1kg, 5kg y 10kg

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por:

Veterquímica S.A.

Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú S.A.C.

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima

USO VETERINARIO
REG SENASA N° F 03.20.I.1541