

DUFLOSAN® 30%



FLORFENICOL 30% - SOLUCIÓN INYECTABLE

Código

400177

Composición

Cada 100mL de solución contienen:

Florfenicol	30 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Especie de destino

Bovinos y cerdos.

Indicaciones de uso

Bovinos: cuadros respiratorios correspondientes a Enfermedad Respiratoria Bovina, causada por *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Haemophilus somnus*, como también cuadros de Queratoconjuntivitis infecciosa Bovina causada por *Moraxella bovis*, todos provocados por microorganismos sensibles a florfenicol.

Cerdos: cuadros respiratorios provocados por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* y *Streptococcus suis*, sensibles a florfenicol.

Vía de administración y dosis

Bovinos: administrar por vía subcutánea en dosis única, 40mg florfenicol/kg de peso vivo (6,6ml DUFLOSAN® 30% /50kgPV). No inyectar más de 10ml en el lugar de administración.

Cerdos: Administrar por vía intramuscular. 15mg florfenicol/kg de peso vivo (1ml DUFLOSAN® 30% /20kgPV). Administrar un total de dos inyecciones con un intervalo de 48 horas.

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30° C) en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Precauciones y advertencia

Puede causar reacciones alérgicas en individuos susceptibles. Puede causar irritación en el lugar de inyección, por lo tanto, no administrar más de 10ml por sitio de inyección. Evitar el contacto del producto con la piel, ojos y ropa. No arrojar envases vacíos o con productos junto con desechos domésticos, en el suelo o cursos de agua. Disponer el producto con empresas especializadas.

Contraindicaciones

No usar en animales destinados a la reproducción. No administrar en hembras en gestación y lactancia. No administrar a animales con hipersensibilidad al florfenicol.

Periodo de resguardo

Carne: Bovinos (49 días), Cerdos (15 días).

No administrar a animales cuya leche se destine para consumo humano.

Presentaciones

Frasco 50ml, 100ml y 250ml

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado por:

VETERQUIMICA S.A.

Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú S.A.C.

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima

USO VETERINARIO
REG SENASA N° F.82.01.I.0358

Página 1 de 1