

YODIGEN® DIPPING 7000

SOLUCIÓN TÓPICA – YODO 0,7%

Código

411306 - 411307

Composición

Solución desinfectante a base de yodo

Propiedades

YODIGEN® DIPPING 7000 es una solución tópica que permite la desinfección de los pezones pre y post ordeña. Controla la mastitis producida por *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Corynebacterium sp.*, y *Escherichia coli* sensibles al producto. Protege la piel de los pezones antes y después de cada ordeño.

Indicaciones y dosis

Administración tópica. Diluir el producto a razón de 1:1 en agua potable.

Pre y post-ordeño: Antes de aplicar el producto, lavar cuidadosamente con agua los pezones de los animales, procurando eliminar toda la materia orgánica que pueda existir en ellos y secar con papel desechable. Luego, previamente a la colocación de la unidad de ordeña, sumergir completamente los pezones unos 30 segundos en YODIGEN® DIPPING 7000 diluido en agua potable (1:1). Remover el producto sobrante secando con papel desechable. Colocar la unidad de ordeña. Posterior e inmediatamente retirada la unidad de ordeña, sumergir los pezones durante 30 segundos en una solución 1:1 de YODIGEN® DIPPING 7000.

Terapia de Secado: Aplicar la terapia de secado y luego sumergir los pezones en YODIGEN® DIPPING 7000 diluido a razón de 1:1 en agua potable durante 30 segundos.

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (15° - 30° C) en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado. Una vez abierto posee una duración de 60 días, almacenado a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

Precauciones

No dejar al alcance de los niños y animales domésticos. En caso de presentar alguna herida, evitar el contacto directo de ésta con el producto, ya que podría producirse una quemadura por yodo. No eliminar envases vacíos ni residuos del producto en cursos de agua. Las medidas de disposición tienen como objetivo la protección del medio ambiente.

Precauciones para el operador

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de elementos de protección como guantes, gafas, mascarilla y ropa de seguridad. En caso de contacto accidental del producto con los ojos, lavar con abundante agua y solicite atención médica. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después del tratamiento. En caso de personas con hipersensibilidad al yodo, en muy escasas ocasiones, se ha descrito que se podrían presentar reacciones cutáneas adversas al compuesto, tales como irritación de la piel, manchas y urticaria. Reacciones adversas sistémicas son extremadamente raras.

Presentaciones

Envase de PEAD de 1L, 5L, 10L, 15L, 20L, 60L y 200L.

Condición de venta

Venta Bajo receta.

Fabricado por:

Veterquímica S.A.

Camino a Lonquén 10387, Maipú, Santiago, Chile

Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú SAC

Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, Lima-Perú.

USO VETERINARIO
REG. SENASA No: F.10.08.I.0180