

# TIGANIL® 450



## ANTIBIÓTICO - POLVO ORAL

### Código

4XXXXXX

### Composición

Cada 100g de producto contienen:

Tiamulina fumarato hidrogenado (eqv. 45g de tiamulina base)	56,25 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g

### Especie de destino

Pollos, ponedoras en crianza y recría, pavos, cerdos

### Indicaciones de uso

**TIGANIL® 450** actúa en el tratamiento de Neumonía enzoótica, Disentería, Ileítis, Síndrome Respiratorio Porcino y Enfermedad Respiratoria Crónica de las aves, causadas por gérmenes sensibles a tiamulina.

### Vía de administración y dosis

Por vía oral, disuelto en el agua de bebida.

**Cerdos: Neumonía:** 20 a 23,1mg tiamulina base/kg/día durante 5 a 10 días (equiv. 25 a 28,8mg de tiamulina fumarato/kgPV/día). **Disentería porcina:** 7,7mg tiamulina base/kgPV/día durante 5 días (equiv. 9,6mg de tiamulina fumarato/kgPV/día). **Ileítis:** 6 a 9mg tiamulina base/kgPV/día durante 7 a 14 días (equiv. 7,5 a 11,25mg de tiamulina fumarato/kgPV/día). **Síndrome Respiratorio Porcino:** 8 a 9mg tiamulina base/kgPV/día durante 5 a 14 días (equiv. 10 a 11,25mg de tiamulina fumarato/kgPV/día).

**Aves:** 30 a 60mg de tiamulina base/kgPV/día, durante 3 a 5 días (equiv. 37,5 a 75mg de tiamulina fumarato/kgPV/día).

### Recomendaciones para su incorporación en el agua de bebida

Adicionar la cantidad de **TIGANIL® 450** según la cantidad de animales a tratar, disolver en una fracción de agua a administrar y luego, completar el total del volumen calculado. Este volumen deberá corresponder a un tercio (1/3) del total del consumo de agua diario estimado según edad, peso y condición climática.

Suspender el suministro de agua mediante bebederos automáticos, desde un par de horas antes y mientras dure la administración de **TIGANIL® 450**. La preparación dosificación de **TIGANIL® 450** deberá realizarse en bebederos destinados únicamente para el tratamiento de los animales enfermos.

### Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30° C) en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado.

### Precauciones

**TIGANIL® 450** deberá ser administrado en una sola toma diaria. No reutilizar restos de la solución preparada. Preparar las soluciones diariamente. La solución deberá ser preparada bajo supervisión del Médico Veterinario.

Limpiar muy bien los equipos antes de mezclar, para no incorporar residuos de otros medicamentos.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

### Contraindicaciones

No mezclar con alimentos que contengan como principios activos lasalócido, monensina, salinomicina o narasina.

### Periodo de resguardo

Carne: 7 días.

No administrar a ponedoras cuyos huevos se destinen para consumo humano.

### Presentaciones

Bolsa 810g, sachets 81g

### Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

### Fabricado por:

VETERQUIMICA S.A.

### Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú S.A.C.

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima

USO VETERINARIO  
REG SENASA N°F.82.70.I.0309