

IPE-VAC® INMERSIÓN



VACUNA INACTIVA – SUSPENSIÓN ACUOSA INMERSIÓN

Código

402626

Composición

Cada 1mL contienen:

Virus IPN, Cepa VQ-IPNV-001, Serotipo Sp. 1×10^8 – 5×10^8 TCID₅₀

Excipientes c.s.p. 1,0 mL

Inactivante: solución de formaldehído.

Adyuvante hidrosoluble

Especie de destino

Trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*)

Indicaciones de uso

Inmunización activa para reducir las lesiones pancreáticas producidas por el virus de la Necrosis Pancreática infecciosa en Trucha arcoíris.

Vía de administración y dosis

Agitar vigorosamente antes de usar. Se debe detener el flujo de agua en el estanque y mantener con un mínimo de 8ppm de oxígeno disuelto (DO). Preparar una dilución de 1L de la vacuna por cada 1000L de agua dulce del estanque. Para ello, previamente se diluye 1L de la vacuna en 10L de agua dulce del estanque. Luego esta solución se aplica al estanque con 990L de agua dulce para su debida homogenización. Una vez preparada la dilución, la vacunación se debe realizar en el lapso máximo de 2 horas. Sumergir los peces durante 1 hora para que el proceso de vacunación sea óptimo. La biomasa posible de inmunizar por unidad de volumen de suspensión vacunal es de 25kg/L de vacuna. El protocolo de vacunación es desde los 0.5g. El esquema de vacunación dependerá del historial clínico y prevalencia del sitio de cultivo, pudiendo ser una inmunización o hasta 3, según cada caso. En general para peces de menor gramaje (0.5g) se recomienda 3 inmunizaciones y peces sobre los 4g se recomienda una inmunización. El número de aplicaciones dependerá de la recomendación del Médico Veterinario.

Inmunidad y duración

El establecimiento de la inmunidad es a 600 UTA y la duración de la inmunidad es a 1120 UTA (3 meses aproximadamente).

Advertencias y precauciones de uso

No exceder la aplicación por más de 1 hora y 15min. La aplicación debe hacerse a peces con ayuno previo de 24 horas. Los peces deben nadar libremente en el estanque durante la aplicación de la vacuna, no superando una densidad de 35kg/m².

No realizar más de 16 inmersiones con la misma solución preparada 1:1000. No aplicar cuando las condiciones del agua estén alteradas especialmente por presencia de materia orgánica y sedimentos que aparecen después de las lluvias.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

No vacunar durante en procesos de smoltificación. No vacunar peces reproductores. No vacunar peces enfermos, débiles o estresados. No efectuar otros tratamientos con los peces durante el proceso de vacunación. No vacunar peces que hayan sido recientemente transportados desde otro lugar al sitio de vacunación, incluyendo un tiempo mínimo de 12 horas de descanso prevacunación. No vacunar peces con lesiones o infecciones cutáneas o branquiales, ni en situaciones de déficit de oxígeno o presencia de algas y/o microalgas.

Efectos no deseados o reacciones adversas

No se conocen efectos indeseados asociados a la vacuna.

Almacenamiento

Almacenar la vacuna bajo refrigeración (entre 2° C a 8° C) en su envase original y protegida de la luz. NO CONGELAR.

Período de resguardo

Cero grados/día.

Período de resguardo

18 meses. Una vez abierto utilizar su totalidad y eliminar el excedente.

Presentaciones

Frasco 1L.

Condición de venta

Venta bajo receta

USO EXCLUSIVO PARA ACUICULTURA.

Fabricado por:

VETERQUIMICA SA.

Importado y Distribuido por:

VETERQUIMICA PERU S.A.C.

Av. Huarochirí s/n Mz. E Lote 20 Urb. Santa Raquel Ate Lima

USO VETERINARIO-ACUICULTURA
REG SANIPES No. RSPV0022IIE